



STOP

à la grippe aviaire !

RÉDUISEZ LE RISQUE D'INTRODUCTION DU VIRUS

Clôturez entièrement les espaces extérieurs ou **équipez-les de filets**, y compris sur le dessus, afin d'empêcher les oiseaux sauvages d'y pénétrer.

Portez systématiquement des **vêtements propres** et **lavez vos mains et vos chaussures** à chaque fois que vous entrez dans l'exploitation.

Prévoyez des pédiluves désinfectants ou des couvre-chaussures jetables à la porte de l'exploitation. **Désinfectez les véhicules et les outils** à l'arrivée dans l'exploitation ou lors des déplacements entre exploitations.

Protégez votre exploitation
#NoBirdFlu



DÉTECTEZ les signes

IDENTIFIER-SIGNALER

Si vous remarquez un signe inhabituel dans votre élevage, comme une diminution de la consommation de nourriture ou d'eau, une mortalité soudaine ou d'autres symptômes de maladie, **signalez-le immédiatement** à votre vétérinaire ou aux autorités sanitaires locales.

Une mise en place rapide des mesures appropriées augmentera vos chances d'enrayer une grave épidémie de grippe aviaire et de **protéger vos élevages ainsi que ceux qui se trouvent à proximité.**



Protégez votre exploitation
#NoBirdFlu



 **Gefsa** 
EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY



UNE espèce, UN espace

EMPÊCHEZ LA PROPAGATION DE LA GRIPPE AVIAIRE

Les différents
types de volailles
(comme les
poulets, les
canards et les
dindes) **doivent
être tenus à
l'écart** les uns
des autres.



Protégez votre exploitation
#NoBirdFlu

